ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ k ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ & ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ Α.Α.Τ.

- Τοποθετούμε στη συσκευή *Hooke* (ελατήριο + μάζα m_H) ένα βαρίδι των 200 g και θέτουμε σε ταλάντωση το σύστημα.
- Μετράμε το χρόνο 10 περιόδων (διαιρούμε με το 10) και καταγράφουμε στον παρακάτω πίνακα την περίοδο που αντιστοιχεί στα 200 g.
- Συνεχίζουμε να προσθέτουμε βαρίδια των 200 g και να μετράμε τις περιόδους ταλάντωσης του συστήματος. Συμπληρώνουμε τον πίνακα:

m (kg)	T (s)	T^2 (s²)
0,2		
0,4		
0,6		
0,8		
1,0		

- Ο τύπος που δίνει την περίοδο του συστήματος είναι: $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m_H + m}{k}}$

- Επιλύοντας την εξίσωση καταλήγουμε στην:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m_H + m}{k}} \Rightarrow T^2 = 4\pi^2\frac{m_H + m}{k} \Rightarrow \boxed{T^2 = 4\pi^2\frac{m_H}{k} + \frac{4\pi^2}{k}m}$$

$$y = \beta + \alpha \cdot x$$

- Βλέπουμε ότι αν αλλάξουμε μεταβλητή (από T σε T^2) έχουμε εξίσωση ευθείας με κλίση: α και σημείο τομής με τον κατακόρυφο άξονα: β.



- ***Με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα κατασκευάστε διάγραμμα T^2- m.***
- ***Υπολογίστε την κλίση της ευθείας και από αυτήν τη σταθερά του ελατηρίου.***
- ***Από το σημείο τομής της ευθείας με τον κατακόρυφο άξονα, να υπολογίσετε την αρχική μάζα m_H της συσκευής Hooke.***

- $\alpha = \text{κλίση} = \varepsilon\varphi = \text{————————} \Rightarrow \boxed{\alpha =}$
- $\alpha = \dfrac{4\pi^2}{k} \Rightarrow k =$ $=$ $\Rightarrow \boxed{k =}$
- $\boxed{\beta =}$
- $\beta = 4\pi^2\dfrac{m_H}{k} \Rightarrow m_H =$ $=$ $\Rightarrow \boxed{m_H =}$